Photo: © Stefan Von Stengel - Budersand

TourTurf® Thatch-Less® FTD

Fungi Thatch Degrader

Abbau von Rasenfilz und Filzkontrolle

Entwickelt für den Abbau von Rasenfilz und zur Rasenfilzbekämpfung.

TourTurf® Thatch-Less® FTD Fungi Thatch Degrader ist ein vollständig wasserlösliches Pulver mit hochkonzentrierten Stämmen von Trichoderma-Pilzen, Biostimulanzien und anderen nützlichen Mikroorganismen zur biologischen Bekämpfung von Rasenfilz in Sportrasen. Die Bekämpfung von Rasenfilz ist der Schlüssel zu gesundem Rasen, ungehinderter Nährstoff- und Wasseraufnahme in die Wurzelzone und festen, ebenen, bespielbaren Oberflächen.

Das Produkt ist ein 100 % biologisches Produkt, das eine Kombination aus Biostimulanzien (Fulvosäure und Kohlenhydrate), Algenextrakt sowie natürlichen Bodenpilzen und Bakterien enthält, die speziell zur Beschleunigung des natürlichen Abbaus von Rasenfilz und organischen Stoffen im Rasen entwickelt wurden.

Dieses Produkt enthält zwei hochwirksame Trichoderma-Pilze und acht effektive Mikroorganismen, die Cellulose, Hemicellulose und Lignin abbauen können, die typischerweise in Rasenfilz und organischen Stoffen auf allen gängigen Sportrasenflächen wie Grüns, Abschlägen und Spielfeldern vorkommen.

Die Bakterien und Pilze produzieren zusammen hohe Mengen an gemischten Cellulasen sowie Lignase und Laccase, die gemeinsam Pflanzenfasern zu Zuckern abbauen, die dann als Nahrung für die Mikroflora im Boden zur Verfügung stehen.

Unsere Mikroorganismenstämme sind durch Genomanalyse (DNA-Fingerprint) vollständig rückverfolgbar.

Garantierter Inhalt

Kohlenhydrate (Dextrose)	15,0%
Algenextrakt	1,0%
Fulvinsäure	0,55%
Filz abbauende Pilze:	
Trichoderma viridae	2,25x10^7 KbE/g
Trichoderma reesei	2,65x10^7 KbE/g
Insgesamt	4,90x10^7 KbE/g
Filz abbauende Mikroorganismen:	
Bacillus subtilis	2,0x10^8 KbE/g
Bacillus licheniformis	1,0x10^9 KbE/g
Bacillus amyloliquefaciens	2,0x10^8 KbE/g
Bacillus megaterium	2,0x10^8 KbE/g
Bacillus pumilus	2,0x10^8 KbE/g
Bacillus polymyxa	1,0x10^8 KbE/g
Pseudomonas putida	2,20x10^8 KbE/g
Pseudomonas fluorescens	2,20x10^8 KbE/g
Insgesamt	2,34x10^9 KbE/g

pH-Wert: 7,5.
Dichte: 1,01.
Spritzdüsen: Düsen für größere Tröpfchen.
Optimale Produktleistung zwischen 15 und 30 °C.
Das vorgefilterte Produkt passiert problemlos 100er-Sprühfilter (150 µm) – den kleinsten gängigen Filter in Sprühgeräten.

Thatch-Less® Organic Matter Control

OF&G ORGANIC – PRODUCT APPROVED FOR RESTRICTED USE

Anwendung

2–4-Mal pro Jahr bei über 10 °C.

Filzabbau: 2 kg/ha gemischt in 700 l Wasser.
Disease Recovery: 4 kg/ha gemischt in 700 l Wasser.
Anwendung: In 10 L handwarmes Wasser (35°C.) pro kg Produkt geben. Gießen Sie die Mischung in ein Sieb und dann in den Sprühtank unter Rühren.
Synergie mit OXT, ETD, EXC & MCB

Bestellnummer

8593
2 x 1 kg pro Karton

KbE = Kolonie-bildende Einheiten.
TourTurf® - Respond® - Thatch-Less® are registered trademarks belonging to E. Marker A/S.

Manufacturer & distribution | Hersteller/Inverkehrbringer:
E. Marker A/S · Okslundvej 8, Bov · DK-6330 Padborg · Tel: +45 74 67 08 08 · E-mail: info@emarker.dk · www.emarker.dk
For information on product use, availability or MSDS requests, please visit www.tourturf.com